

赤かぶ病害虫防除暦

防除体系(登録薬剤)

令和6年度(2024年)版 JA庄内たがわ赤かぶ部会

2023.12.20登録農薬情報により作成

| 防除時期 | 対象病害虫 | RAC コード | 登録農薬名 | 希釈倍数 | 水100リットル 当たり 薬剤量 | 使用時期 | 使用回数 | 備 考 |
|----------------------|--|---------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------|
| は種前 (播種前) ~は種時 | 根こぶ病 | F:36 | ネビジン粉剤 | 30kg/10a | - | 播種前 | 1回 | 全面土壌混和 |
| | 根こぶ病 | F:21 | オラクル粉剤 | 30kg/10a | - | 播種前 | 2回以内 | 全面土壌混和 |
| | キスジノミハムシ | I:3A | フォース粒剤(劇) | 4kg/10a | - | 播種時 | 1回 | 播溝土壌混和 |
| | キスジノミハムシ・アブラムシ類 | I:4A | スタークル粒剤 | 6kg/10a | - | 播種時 | 1回 | 播溝土壌混和 |
| 発芽後 | キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類 アオムシ コナガ | I:1B | エルサン乳剤(劇) | 1,000倍 | 100ml | 収穫30日前まで | 2回以内 | |
| 生育期 | キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類 | I:21A F:39 | ハチハチ乳剤(劇) | 2,000倍 | 50ml | 収穫7日前まで | 1回 | |
| | コナガ | I:6 | アニキ乳剤 | 1,000倍 | 100ml | 収穫前日まで | 3回以内 | |
| | キスジノミハムシ | | | 2,000倍 | 50ml | | | |
| | アブラムシ類 | I:1B | マラソン乳剤 | 2,000倍 | 50ml | 収穫14日前まで | 4回以内 | |
| | 軟腐病・黒腐病・斑点細菌病 | F:M01 | コサイド3000 | 2,000倍 | 50g | - | - | バイカルティ1000倍加用 |
| 除草剤 | 一年生雑草 (ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科除く) | | トレファノサイド乳剤 | 薬量 150ml/10a | | 播種直後 | 1回 | 全面土壌散布 散布液量100リットル/10a |
| | 一年生イネ科雑草 (スズメカサビラを除く) | | ナブ乳剤 | 薬量 150~200ml /10a | | 雑草生育期:イネ科雑草3~5 葉期。但し収穫7日前まで | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 散布量100~150リットル/10a |

※野菜類
で登録

* 使用時期の「収穫の前日まで」とは、薬剤散布を終了した時刻より24時間を経過するまで収穫出来ないことを示します。

* 10a当りの散布量は生育に応じて100リットル~150リットル位。但し、除草剤については各薬剤の散布薬剤量で使用する。

1. 病害虫の発生状況等を見て散布してください。
2. 適正な栽植密度とし通風・作業性をよくしてください。
3. 園地の適切な排水管理に努める。
4. 病害虫の温床となるものについては随時、適切に撤去する。
5. ドリフト軽減ノズルや防薬ネットを使用しましょう。