

里芋病虫害防除暦

JA庄内たがわ

防除体系（登録薬剤）

2024.1.1時点の農業登録情報をもとに作成

令和6年（2024年）版

防除時期	対象病虫害(雑草)	登録農薬名	希釈倍数・使用量	水100 ^{リットル} 当り 薬剂量	使用時期	使用回数	RAC コード	備 考
植付け前	黒斑病	ベンレートT水和剤20	種芋重量の0.4~0.5%	—	植付け前	1回	F:M03 F:1	種芋粉衣
植付け前	コガネムシ類幼虫	ダイアジノンSLゾル	25~50倍 100ℓ/10a	4000~ 2000ml	植付け前	1回	I:1B	全面土壌混和
植付け時	アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	4kg/10a	—	植付け時	1回	I:4A	植溝土壌混和
生育期	ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍 100~300ℓ/10a	25g~50g	収穫前日まで	2回以内	I:28	散布
生育期	ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000倍 100~300ℓ/10a	100ml	収穫14日前まで	3回以内	I:3A	散布
生育期	アブラムシ類	ウララDF	2000倍 100~300ℓ/10a	50g	収穫7日前まで	2回以内	I:29	散布
生育期(土寄せ時)	コガネムシ類幼虫	オンコル粒剤5	6~9kg/10a	—	生育期(但し、収穫 60日前まで)	1回	I:1A	株元土壌混和
生育期	ハダニ類	コロマイト乳剤	1000倍 100~300ℓ/10a	100ml	収穫前日まで	2回以内	I:6	散布
生育期	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	コテツフロアブル(劇)	2000倍 100~300ℓ/10a	50ml	収穫7日前まで	2回以内	I:13	散布
植付後	一年生雑草	ゴーゴーサン細粒剤F	4~6kg/10a	—	植付後萌芽前(雑 草発生前)	1回以内	H:3	全面土壌散布
植付後	一年生雑草	クレマート乳剤	200~400ml/10a 散布液量100~150ℓ /10a	—	植付後萌芽前(雑 草発生前)	1回以内	H:3	全面土壌散布
雑草生育期	一年生雑草	バスタ液剤	300~500ml/10a 散布液量100~150ℓ /10a	—	収穫30日前まで(雑 草生育期植付前又 は畦間処理)	3回以内	H:10	雑草茎葉散布