

焼畑あつみかぶ病害虫防除体系

【令和7年版】

JA庄内たがわ 温海支所

温海園芸振興部会 あつみかぶ専門部

2025.2月時点の農薬登録情報により作成

	対象病害虫	登録農薬名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考	
殺虫剤	キスジノミハムシ・アブラムシ類	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1回	播溝土壌混和(播種直後、土壌混和)	
	ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	播種時	1回	合わせて 2回以内	作条散布
	キスジノミハムシ			出芽時	1回		土壌表面散布
				作物生育中 収穫45日前まで	1回		株元散布
	ハスモンヨトウ・アオムシ	エルサン粉剤2	3kg/10a	収穫30日前まで	合わせて 2回以内		
	キスジノミハムシ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	エルサン乳剤(劇物)	1,000倍	収穫30日前まで		【劇物】～櫛引・藤島JAグリーン資材窓口にて、印鑑・受領印必要。	
	カブラハバチ・アブラムシ類	マラソン粉剤3	3kg/10a	収穫14日前まで	合わせて 4回以内		
	カブラハバチ・アオムシ	マラソン乳剤	1000倍	収穫14日前まで			
	ハスモンヨトウ	プレオ フロアブル	1000倍	収穫3日前まで	2回以内		
	コナガ・キスジノミハムシ・メイガ類・ハスモンヨトウ・アオムシ	プロフレア SC	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内		
	コナガ	アニキ乳剤	1,000倍	収穫前日まで	3回以内		
キスジノミハムシ	2,000倍						
殺菌剤	軟腐病	コサイド3000	2,000倍	—	—	バイカルティ1000倍加用 100~300L/10a	
	軟腐病・べと病	ヨネポン水和剤	500倍	収穫7日前まで	4回以内		
除草剤	畑地一年生雑草	ラウンドアップ マックスロード	200~500ml /10a	耕起前まで 【雑草生育期】	1回	通常散布50~100L/10a 少量散布5~50L/10a 雑草茎葉散布	

* 使用時期の「収穫の前日まで」とは、薬剤散布を終了した時刻より24時間を経過するまで収穫出来ないことを示します。

* 10a当りの散布量は生育に応じて150リットル~200リットル位。

1. 病害虫は多発してからの防除では遅い！出来るだけ予防防除に努める。
2. 適正な栽植密度とし、間引きをするなど通風・作業性をよくしてください。
3. 高温時の防除は、薬害を起こす恐れがあるので避ける。早朝か夕方に行う。
4. 防除の際は散布機の洗浄を確認し、他剤との混用にならないように注意する。
5. ドリフト軽減ノズルや防薬ネットを使用するなど、飛散防止に努める。