

里芋病害虫防除暦

JA庄内たがわ
令和8年（2026年）版

防除体系（登録薬剤）

2025.12.10時点の農業登録情報をもとに作成

種類	防除時期	対象病害虫(雑草)	登録農薬名	希釈倍数	使用量	水100%当り 薬剤量	使用時期	使用回数	RAC コード	備 考
殺菌剤	植付前	黒斑病	ベンレートT水和剤20	-	種芋重量の0.4～0.5%	-	植付前	1回	F:M03 F:1	種芋粉衣
		コガネムシ類幼虫	ダイアジノンSLゾル	25～50倍	100ℓ/10a	4000～ 2000ml	植付前	1回	I:1B	全面土壌混和
殺虫剤	植付前	アブラムシ類	アドマイヤー1粒剤	-	4kg/10a	-	植付時	1回	I:4A	植溝土壌混和
		コガネムシ類幼虫	オンコル粒剤5	-	6～9kg/10a	-	生育期(但し、収穫60日前まで)	1回	I:1A	株元土壌混和 土寄せ時
		ハスモンヨトウ	トレボン乳剤	1000倍	100～300ℓ/10a	100ml	収穫14日前まで	3回以内	I:3A	散布
	生育期	アブラムシ類	ウララDF	2000倍	100～300ℓ/10a	50g	収穫7日前まで	2回以内	I:29	散布
		カンザワハダニ ハスモンヨトウ	コテツフロアブル(劇)	2000倍	100～300ℓ/10a	50ml	収穫7日前まで	2回以内	I:13	散布
		ハダニ類	コロマイト乳剤	1000倍	100～300ℓ/10a	100ml	収穫前日まで	2回以内	I:6	散布
		ハスモンヨトウ	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	25g～50g	収穫前日まで	2回以内	I:28	散布
除草剤	植付後 (萌芽前)	一年生雑草	ゴーゴーサン細粒剤F	-	4～6kg/10a	-	植付後萌芽前(雑草発生前)	1回以内	H:3	全面土壌散布
		一年生雑草	クレマート乳剤	-	200～400ml/10a 散布液量100～150ℓ/10a	200～400ml	植付後萌芽前(雑草発生前)	1回以内	H:3	全面土壌散布
	雑草生育期	一年生雑草	バスタ液剤	-	300～500ml/10a 散布液量100～150ℓ/10a	300～500ml	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・植付前又は畦間 処理)	3回以内	H:10	雑草茎葉散布

適正管理について！

1. 病害虫の発生状況・予察に留意しながら予防・発生初期防除を心がける。
2. 圃地の適正な排水管理を行う。
3. ドリフト軽減ノズルや防薬ネット等を出来る限り 使用する。
4. みつばちへの配慮を行う。

防除器具の農薬残留に留意！！

- ・防除器具は、前回散布後に充分洗浄したか確認し、散布当日も薬剤調整前にもう一度通水し洗浄しましょう。
- ・防除器具は使用后、通水で3回以上洗浄しましょう。
- ・洗浄水は川や下水等に流さないようにしましょう。