

2026年度 長ねぎ 病害虫防除体系

JA庄内たがわ
2026年1月7日時点の農業登録情報をもとに作成

| 殺虫剤 | 防除時期 | | | | | | | 系統 | IRACコード | 薬剤名 | 希釈倍率 または 処理量 | 水 100ℓ当薬 剤量 | 使用時期 (収獲前日数) | 使用回数 | 使用方法及び備考 | | | |
|-----|--------|------|--------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | キノコバエ類 | ネダニ類 | ネギコガ | シロイチモジ ヨトウ | ハモグリバエ類 | ネギハモグリバエ | アザミウマ類 | | | | | | | | | ネギアザミウマ | ネキリムシ類 | |
| 殺虫剤 | | | | ○ | ○ | | ○ | M | 28 | いずれかを選択 | ベリマークSC | 400倍 セル成型育苗トレイ1箱 又は ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用 土壌約1.5～4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後 半～定植 当日 | 1回 | かん注 ※トリフミン水和剤との混用事例なし | | | |
| | | ○ | | | | ○ | ○ | A M | 4A 28 | | ジュリボフロアブル | 200倍 セル成型育苗トレイ1箱 又は ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用 土壌約1.5～4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後 半～定植 当日 | 1回 | かん注 ※トリフミン水和剤との混用事例なし | | | |
| | | | | | | ○ | ○ | A | 4A | ベストガード粒剤 | 6kg/10a | | 定植時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | | | |
| | ○ | ○ | | | | | | H | 1B | トクチオン細粒剤F | 9kg/10a | | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | | | |
| | ○ | ○ | | | | | ○ | | 3A | フォース粒剤(劇) | 9kg/10a | | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | | | |
| | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 30日前 | 1回 | 株元散布 | | | |
| | | | | | | | ○ | H | 1B | ネキリエースK | 3kg/10a | | 30日前 | 2回以内 | 土壌表面株元処理 | | | |
| | | ○ | | | | ○ | ○ | A | 4A | ダントツ粒剤 | 6kg/10a | | 3日前 | 4回以内 | 株元散布 | | | |
| | | | ○ | ○ | ○ | | | M | 28 | ブリロッソ粒剤オメガ | 6kg/10a | | 前日 | 3回以内 | 株元散布 | | | |
| | ○ | | | | | | | | 16 | アプロードフロアブル | 500倍 | 200ml | 14日前 | 1回 | 株元かん注 (1～3ℓ/m ²) | | | |
| | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | B | 30 | グレーシア乳剤 | 2000倍 | 50ml | 7日前 | 2回以内 | | | | |
| | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | H | 1B | トクチオン乳剤 | 1000倍 2000倍 | 100ml 50ml | 7日前 | 3回以内 | 株元かん注 3ℓ/m ² | | | |
| | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 14 | リーフガード顆粒水和剤(劇) | 1500倍 | 66g | 7日前 | 2回以内 | | | | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 21A | ハチハチ乳剤(劇) | 1000倍 | 100ml | 7日前 | 2回以内 | さび病、べと病に登録あり | | | |
| | | | ○ | ○ | | ○ | | | 13 | コテツフロアブル(劇) | 2000倍 | 50ml | 7日前 | 2回以内 | | | | |
| ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | M | 28 | ヨーバルフロアブル | 2500倍 | 40ml | 3日前 | 3回以内 | | | | | |
| | | | | | ○ | ○ | | 6 | アグリメック(劇) | 1000倍 | 100ml | 3日前 | 3回以内 | | | | | |
| | | | | | ○ | ○ | A | 4A | アクタラ顆粒水溶剤 | 1000倍 | 100g | 3日前 | 3回以内 | | | | | |
| | | | | | ○ | ○ | | 9B | コルト顆粒水和剤 | 2000倍 | 50g | 3日前 | 3回以内 | 予防的に使用。食害がある時は他剤を使用する。 | | | | |
| | | ○ | ○ | ○ | | | M | 28 | プレバソンフロアブル5 | 2000倍 | 50ml | 3日前 | 3回以内 | | | | | |
| | | ○ | ○ | | ○ | | | 5 | ディアナSC | 2500倍 | 40ml | 前日 | 2回以内 | | | | | |
| | | ○ | ○ | ○ | | | B | 30 | プロフレアSC | 2000倍 | 50ml | 前日 | 3回以内 | | | | | |
| 殺菌剤 | 防除時期 | | | | | | | 系統 | FRACコード | 効果等 | 薬剤名 | 希釈倍率 または 処理量 | 水 100ℓ当薬 剤量 | 使用時期 (収獲前日数) | 使用回数 | 使用方法及び備考 | | |
| | 黒腐菌核病 | 白絹病 | 小菌核腐敗病 | べと病 | 黒斑病 | 葉枯病 | さび病 | | | | | | | | | | 軟腐病 | 萎ちよう病 |
| | | | | | | | | ○ | 定植前 | イ | 3 | 予防・治療 | トリフミン 水和剤 | ①50倍(5～30分間苗根部浸漬) 苗床かん注(セル成型育苗トレイ1箱又はペー パーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5ℓにつき) ②100倍では0.5リットル/箱・冊 ③200倍では1リットル/箱・冊 | 定植直前 定植前 | 1回 | ※トリフミン水和剤を使用する場 合、①、②、③のいずれかとする。 | |
| | | | | ○ | | | | | 梅雨 | | 21 | 予防・治療 | ランマンフロアブル | 2000倍 | 50ml | 3日前 | 4回以内 | 梅雨時期のべと病対策 |
| | | | | | | | | ○ | 高温期 (軟腐病) | | P02 | ☆予防 | オリゼメート粒剤 | 6kg/10a | | 30日前 | 2回以内 | 土寄せ時 株元散布 |
| | | | | | | | ○ | ホ | | 24・M01 | 予防・治療 | カスミンボルドー | 1000倍 | 100g | 14日前 | 2回以内 | | |
| | | | | | | | ○ | | | 31 | 予防・治療 | スターナ水和剤 | 2000倍 | 50g | 7日前 | 3回以内 | | |
| | | ○ | | | | | | ○ | | U18 | ☆予防・治療 | バリダシン液剤5 | 500倍 | 200ml | 前日 | 2回以内 | 白絹病は株元散布 | |
| | | | | ○ | | | | ○ | ホ | M01 | ☆予防 | Zボルドー | 500倍 | 200g | 発病前～発病初期 | - | 高温時葉害注意、野菜類(キャベツを除く)で登録 | |
| | | | | | | | | ○ | ホ | M01 | ☆予防 | コサイド3000 | 2000倍 | 50g | - | - | 葉害軽減にクレフン(200倍)加用。野菜類で登録 | |
| | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 生育期 | へ | M03 | ☆予防 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 | 166g | 14日前 | 3回以内 | 合わせて3回以内 |
| | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | イ・へ | | 3・M03 | 予防・治療 | テーク水和剤 | 600倍 | 166g | 14日前 | | | |
| | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | M05 | ☆予防 | ダコニール1000 | 1000倍 | 100ml | 14日前 | 3回以内 | | |
| | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ハ | | 11 | 予防・治療 | アミスター20フロアブル | 2000倍 | 50ml | 3日前 | 4回以内 | | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ハ | | 11 | 予防・治療 | メジャーフロアブル | 2000倍 | 50ml | 前日 | 3回以内 | | |
| ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ニ | 7 | 予防・治療 | カナメフロアブル(劇) | 4000倍 | 25ℓ | 前日 | 4回以内 | 白絹病、黒腐菌核病は株元散布 | | | |
| ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ニ | 7 | 予防・治療 | パレード20フロアブル | 2000倍 | 50ml | 前日 | 3回以内 | | | | |
| ○ | ○ | | | | | | ニ | 7 | 予防・治療 | アフエットフロアブル | 2000倍 | 50ml | 14日前 前日 | 2回以内 | 株元かん注(1ℓ/m ²) | | | |
| | | ○ | ○ | | | | 主に軟白秋期 | | 2 | 予防・治療 | ロブラール水和剤 | 1000倍 500倍 | 100g 200g | 14日前 | 3回以内 | ホトリチス葉枯症に登録あり 株元かん注(1ℓ/m ²) | | |
| | | ○ | | | | | | | 1 | 予防・治療 | トップジンM水和剤 | 1000倍 | 100g | 7日前 | 3回以内 | ※収穫間際の使用は避けること | | |
| ○ | ○ | | | | | | | | 12 | 予防 | セイビアーフロアブル20 | 1000倍 | 100ml | 前日 | 3回以内 | | | |

※殺虫剤・殺菌剤は、同系統の薬剤を連用・多用しない。 ☆耐性菌がでにくい薬剤

※除草剤は裏面にあります。→