

令和8年度 ストック 防除基準

JA庄内たがわ

令和8年1月6日時点の農薬登録情報を基に作成

ヨトウムシ類	アザミウマ類	コナガ	アブラムシ類	ハモグリバエ類	ハイマダラノメイガ	オオタバコガ	CORIDC	薬剤の系統 (又は成分)	薬剤名	劇物	使用基準			備考	
											希釈倍数 又は 使用量	水100ℓ 当り薬剤量	使用回数		
		○					1A	カーバメート	ガゼット粒剤	劇	定植時 9kg/10a	—	1回	株元散布	
	○		○				1B	有機リン	ジェイエース粒剤		1~2g/株	—	5回以内	株元散布(9kg/10aまで)	
○	○	○	○							オルトラン水和剤		1,000倍	100ml	5回以内	ジェイエース粒剤と合わせて5回以内
○			○		※		3A	ピレスロイド	アディオン乳剤		2,000倍	50ml	6回以内	※他品目でハイマダラノメイガにも登録有	
			○				4A	ネオニコチノイド	スタークル顆粒水溶剤		2,000倍	50ml	5回以内		
				○						アクタラ顆粒水溶剤		2,000倍	50ml	6回以内	ミカンキイロアザミウマに適用
	※									1,000倍	100ml				
	○		○							モスピラン水溶剤	劇	2,000倍	50ml	5回以内	
	○			○	※	○	5	スピノシン	ディアナSC		2,500倍	40ml	2回以内	薬害注意 ※他品目でハイマダラノメイガにも登録有	
○		○		○	※	○	6	マクロライド	アフアーム乳剤		1,000倍	100ml	5回以内	※他品目でハイマダラノメイガにも登録有	
	○				※					2,000倍	50ml				※他品目でハイマダラノメイガにも登録有
		○			※					アニキ乳剤		1,000倍	100ml	6回以内	※他品目でハイマダラノメイガにも登録有
		○					11A	BT	トアロー水和剤CT		1,000倍	100g	—		
		○								バシレックス水和剤		1,000倍	100g	—	
○	※	○					13	ピロール	コテツフロアブル	劇	2,000倍	50ml	2回以内	ミカンキイロアザミウマに適用	
○		○					15	ベンゾイル尿素	ノーモルト乳剤		2,000倍	50ml	2回以内		
					※	○	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		1,000倍	100ml	6回以内	※他品目でハイマダラノメイガにも登録有	
※					※	○	28	ジアミド	フェニックス顆粒水和剤		2,000倍	50ml	4回以内	ハスモンヨトウに適用 ※他品目でハイマダラノメイガにも登録有	

萎凋病	立枯病 (ツザリウ)	立枯病 (リソクトニア)	菌核病	黒斑病	灰カビ病	CORIDC	薬剤の系統 (又は成分)	薬剤名	劇物	使用基準			備考
										希釈倍数 又は 使用量	水100ℓ 当り薬剤量	使用回数	
○	○					8B	クロルピクリン	クロールピクリン	劇	2~3ml/1穴	—	1回	※センチュウ類にも適用有
○	○								クロルピクリン錠剤	劇	10錠/1㎡	—	1回
○						8F MO3	ダソメット	ガスタード微粒剤	劇	30kg/10a	—	1回	土壌混和
			○			1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤		1,500倍	66g	5回以内	
		○				MO4	フタルイミド	オーソサイド水和剤80		600倍	166g	8回以内	他品目で炭疽病の適用有
					○	7	ピラゾール-4-カルボキサミド	アフエットフロアブル		2,000倍	50ml	3回以内	
		○				14	芳香族炭化水素	リソレックス粉剤		50kg/10a	—	※右記	※粉剤・水和剤合わせて5回以内
		○							リソレックス水和剤		500倍	200g	※右記
			○		○	MO7 19	グアニジン・ヘフチシルピリミジンヌクレオチド	ポリバリン水和剤		1,000倍	100g	※右記	※ポリバリン水和剤 ポリオキシシンAL水溶剤 合わせて8回以内
				○	○	19	ヘフチシルピリミジンヌクレオチド	ポリオキシシンAL水溶剤		2,500倍	40g	※右記	
					○	BM2	バチルス・スプテリス	ボトキラー水和剤		ダクト内投入 【15kg/10a/日】	—	—	

※農薬を混用する際の順番は、『展着剤 → 乳剤 → フロアブル → 水和剤』です。展着剤は必ず最初に添加して下さい。

※農薬防除だけでなく、防虫ネットの設置等、耕種的防除も取り入れましょう。

※農薬は、乾かないと効果を発揮しません！乾くような時間・環境での散布又は乾きやすくなる機能性展着剤の使用をお願いします。