【産直用】いちご防除記録日誌【令和8年度版】

JA庄内たがわ

支所		氏名		組合員コード		作付面積	坪		
品種		仮植日	月　日	定植日	月　日	収穫始め	月　日	収穫終わり	月　日

JA確認		

対象病害虫								薬剤名	希釈倍率 または処理量	収穫前 使用日数 （使用時期）	使用回数	使用方法	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ使用月日を記入して下さい。				
			疫病	萎黄病	炭疽病	灰色かび病	うどんこ病										
				○				ベンレート水和剤	500倍	仮植前	1回	1～3時間苗根部浸漬	□				
					○							10～30分間苗根部浸漬	□				
						○	○	カリグリーン	800倍	収穫前日まで	ー	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
						○	○	フルピカフロアブル	2000～3000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□　/	□　/	□　/		
							○	ジーファイン水和剤	750～1000倍	収穫前日まで	ー	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
							○	ベルクート水和剤	4000倍	収穫前日まで	5回以内	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
						○	○	アミスター20フロアブル	1500～2000倍	収穫前日まで	苗床4回以内 本圃3回以内	散布	□　/	□　/	□　/		
							○	トリフミン水和剤	3000～5000倍	収穫前日まで	5回以内	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
						○	○	パレード20フロアブル	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□　/	□　/	□　/		
			○					ランマンフロアブル	500～1000倍	生育期 但し、収穫30日前まで	2回以内	株元灌注(100ml/株)	□　/	□　/			
			○					レーバスフロアブル	2000倍	生育期 但し、収穫前日まで	本圃:2回以内	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/

対象病害虫								薬剤名	希釈倍率 または処理量	収穫前 使用日数 （使用時期）	使用回数	使用方法	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ使用月日を記入して下さい。				
アブラムシ類（ワタアブラムシ）	コナジラミ類	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	アザミウマ類（ミカンキイロアザミウマ）	うどんこ病										
○								ベストガード粒剤	1g／株	定植時	1回	植穴処理土壌混和	□　/				
○								マブリック水和剤20	8000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
			○	○		（○）		コテツフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
（○）	○		○					サンマイトフロアブル	1000～1500倍	収穫開始3日前まで	1回	散布	□　/				
○			○				○	ピラニカEW	2000～3000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
○	○					○		モスピラン顆粒水溶剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
○								ウララDF	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
			○	○	○	○		グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
						○		スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
						○		ファインセーブフロアブル	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□　/	□　/	□　/		
			○					ダブルフェ―スフロアブル	2000倍	収穫前日まで	1回	散布	□　/				
			○					バロックフロアブル	2000倍	収穫前日まで	1回	散布	□　/				
			○					ダニサラバフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
			○					マイトコーネフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
			○					カネマイトフロアブル	1000～1500倍	収穫前日まで	1回	散布	□　/				
			○					ダニオーテフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□　/	□　/			
○			○			（○）		マラソン乳剤	2000～3000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
						○		マッチ乳剤	1000～2000倍	収穫前日まで	4回以内	散布	□　/	□　/	□　/	□　/	
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/
													□　/	□　/	□　/	□　/	□　/