

2026版【産直用】えだまめ病害虫防除日誌

支所名

播種日

月

日

収穫開始日

月

日

品 種

生産者

定植日

月

日

収穫終了日

月

日

JA確認

①

②

初出荷7日前までを目安に提出してください。基本は圃場ごとに提出（連坦圃場は同一とみなす。）
但し、品種で防除日が違う場合などは、それぞれに提出してください。

使用した薬剤名の欄の □に✓チェックを入れ使用月日を記入して下さい														
防除時期		対象病害虫	登録薬剤名	農薬散布日			希釈倍率・使用量	水１００ℓ 当り薬剤量	使用時期	使用回数 (本剤または同一成分を含む剤)	使用方法			
病害虫	播種前	ネキリムシ類・アブラムシ類・タネバエ・フタスジヒメハムシ、茎疫病、苗立枯病(ピシウム菌)、紫斑病、リゾクトニア根腐病、黒根腐病	クルーザーMAXX	☐	/		原液8ml/乾燥種子1kg		は種前	どちらか 1回	塗沫処理			
		ネキリムシ類・アブラムシ類・タネバエ・フタスジヒメハムシ	クルーザーFS30	☐	/		原液6ml/乾燥種子1kg		は種前		塗沫処理			
センチュウ 対策	は種又は 定植前	ダイズシストセンチュウ	ネマキック粒剤	☐	/		20kg／10a		は種又は定植前	1回	全面土壌混和			
害虫	定植時 播種時	タネバエ、ネキリムシ類	カルホス微粒剤F(劇)	☐	/		6kg／10a		は種時 定植時	1回	土壌表面散布 土壌混和处理			
病害	6月下～ 9月中旬	灰色かび病・菌核病	ロブラール水和剤	☐	/		☐	/	☐	/	1, 000倍	100g	収穫30日前まで	3回以内
		紫斑病、莢汚損症	ゲッター水和剤	☐	/	☐	/	☐	/	1, 500倍	66g	収穫7日前まで	3回以内	散布
		茎疫病、べと病	ランマンフロアブル	☐	/	☐	/	☐	/	1, 000倍	100ml	収穫3日前まで	3回以内	散布
		べと病	アミスター20フロアブル	☐	/	☐	/	☐	/	2, 000倍	50ml	収穫前日まで	3回以内	散布
		べと病・斑点細菌病	クプロシールド	☐	/	☐	/	☐	/	1, 000倍	100ml	—	—	散布
		茎疫病、葉焼病、斑点細菌病、べと病	フェスティバルC水和剤	☐	/	☐	/	☐	/	600倍	166g	収穫前日まで	3回以内	散布
		葉焼病	バリダシン液剤5	☐	/	☐	/	☐	/	500倍	200ml	収穫7日前まで	3回以内	散布
		赤かび病	セイビアーフロアブル20	☐	/	☐	/	☐	/	1, 000倍	100ml	収穫前日まで	3回以内	散布
				☐	/	☐	/	☐	/					
				☐	/	☐	/	☐	/					
害虫	7月上～ 9月上旬	カメムシ類、マメシクイガ、フタスジヒメハムシ、シロイチモジマダラメイガ、ハスモンヨトウ、ウコンノメイガ、ダイズサヤタマバエ、ツメクサガ	トレボン乳剤	☐	/	☐	/			1, 000倍	100ml	収穫14日前まで	2回以内	散 布
		カメムシ類、マメシクイガ、フタスジヒメハムシ	アグロスリン乳剤(劇)	☐	/	☐	/	☐	/	2, 000倍	50ml	収穫7日前まで	3回以内	散 布
		カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ、アブラムシ類、ハモグリバエ類	スタークル顆粒水溶剤	☐	/	☐	/			2, 000倍	50g	収穫7日前まで	2回以内	散 布
		ウコンメイガ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、マメシクイガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類	グレーシア乳剤	☐	/	☐	/			2, 000倍	50ml	収穫前日まで	2回以内	散 布
		マメシクイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ウコンノメイガ	ブレバソンフロアブル5	☐	/	☐	/	☐	/	4, 000倍	25ml	収穫3日前まで	3回以内	散 布
		ハスモンヨトウ	マトリックフロアブル	☐	/	☐	/	☐	/	2, 000倍	50ml	収穫前日まで	3回以内	散 布
		カメムシ類、ハモグリバエ類、マメシクイガ	マラソン乳剤	☐	/	☐	/	☐	/	1, 000倍	100ml	収穫7日前まで	3回以内	散 布
		ハダニ類、アザミウマ類、アブラムシ類、コガネムシ類								2, 000～3, 000倍	33～50ml			
		ハダニ類	コテツフロアブル(劇)	☐	/	☐	/			2, 000倍	50ml	収穫前日まで	2回以内	散 布
		ハダニ類・チャノホコリダニ	ダニトンフロアブル	☐	/					1, 000倍	100ml	収穫7日前まで	1回	散 布
		ハダニ類	コロマイト乳剤	☐	/	☐	/			1, 500倍	66ml	収穫前日まで	2回以内	散 布
				☐	/	☐	/	☐	/					
				☐	/	☐	/	☐	/					

	適用雑草	登録農薬	農薬散布日			10a薬液使用量	10a希釈水量	使用時期	使用回数	使用方法			
除草剤	一年生雑草	コダールS水和剤	☐	/		225～300g	70～100ℓ	は種後出芽前 (雑草発生前)	1回	全面土壌散布			
	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	ナブ乳剤	☐	/		150～200ml	100～150ℓ	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期 (但し、収穫14日前まで)	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布			
	一年生雑草	ザクサ液剤	☐	/	☐	/	☐	/	300～500ml	100～150ℓ	収穫14日前まで (雑草生育期 播種・定植前又は畦間処理)	3回以内	雑草茎葉散布
			☐	/	☐	/	☐	/					
			☐	/	☐	/	☐	/					