

【産直用】なす防除記録日誌（収穫開始以降）

2026年産

支所名		生産者氏名			作物名		なす		品種名		作付面積		圃場NO				
播種日		月日		定植日		月日		収穫始め		月日		収穫終わり		月日		確認	

害虫												薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前使用日数 (使用時期)	使用回数	使用した薬剤名の欄の口に✓チェックを入れ使用月日を記入して下さい。								
類リハ バモ エグ	バモマ エグメ リハ	コオガ オタ バ	シムテ 類シン ダト マウ	類カ メ ムシ	ヨトウ ムシ	ヨハス ウモン	コチ リヤ ダノ ニホ	ハダ ニ類	マア 類ザ ミウ	シア 類ブ ラム	ミコ 類ナ ジラ													
									○ミナミキイロ	○	○	ベストガード粒剤	1～2g /株	定植時	1回	□ /								
			○							○		モスピラン顆粒水溶剤(劇)	4000倍	収穫前日まで	3回以内	□ /	□ /	□ /						
									○		○		2000倍			□ /	□ /	□ /						
○			○	○					○ミナミキイロ	○	○	ダントツ水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	□ /	□ /	□ /						
						○					○	ノーモルト乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /							
○		○				○			○			プレオフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	□ /	□ /	□ /	□ /					
○		○				○						プレバソンフロアブル5	2000倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /							
○		○				○			○		○	ディアナSC	2500倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /							
							○	○				ピラニカEW(劇)	2000倍	収穫前日まで	1回	□ /								
								○				ダニトンフロアブル	2000倍	収穫前日まで	1回	□ /								
							○	○				スターマイトフロアブル	2000倍	収穫前日まで	1回	□ /								
○							○	○			○	コロマイト乳剤	1500倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /							
								○				ダニサラバフロアブル	1000倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /							
								○		○	○オンシツ	テルスター水和剤	1000倍	収穫前日まで	3回以内	□ /	□ /	□ /						
			○	○						○	○オンシツ	アディオン乳剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	□ /	□ /	□ /						
																□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
																□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
																□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		

病 害												薬 剤 名	希 釈 倍 率 または 処 理 量	収 穫 前 使 用 日 数 (使 用 時 期)	使 用 回 数	使 用 し た 薬 剤 名 の 欄 の □ に ✓ チェックを入れ使用月日を記入して下さい。													
菌 斑 病 点 細	べ と 病	軟 腐 病	敗 褐 病 色 腐	病 斑 病 黒 細 ・ 腐 菌 黒	凋 半 病 身 萎	び す 病 す か	菌 核 病	菌 褐 病 斑 細	こ う 病 ど ん	黒 枯 病	び 灰 病 色 か					□	/	□	/	□	/	□	/	□	/				
							○			○	○	ゲッター水和剤	1500倍	収穫前日まで	5回以内	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/				
○	○	○		○		○		○				Zボルドー（野菜類登録）	500倍	発病前～発病初期	-	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
						○	○			○	○	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日まで	4回以内	□	/	□	/	□	/	□	/						
						○			○	○	○	ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで	4回以内	□	/	□	/	□	/	□	/						
			○									ランマンフロアブル	2000倍	収穫前日まで	4回以内	□	/	□	/	□	/	□	/						
						○			○		○	ベルクート水和剤	3000倍	収穫前日まで	3回以内	□	/	□	/	□	/								
									○			モレスタン水和剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	□	/	□	/	□	/								
						○			○			トリフミン水和剤	3000倍	収穫前日まで	5回以内	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
																□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
																□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/

除草剤	薬剤名	使用量	収穫前使用日数(使用時期)	使用回数	使用月日	使用月日	使用月日		
	トレファノサイド粒剤2. 5(※露地栽培のみ)	4～5kg /10a	定植直後うね間土壌散布	1回	□ /				
	バスタ液剤	300～500ml/10a ・ 100ℓ/10a	収穫前日まで雑草生育期定植前又は畦間処理	3回以内	□ /	□ /	□ /		
植物成長調整剤	薬剤名	希釈倍率または処理量	収穫前使用日数(使用時期)	使用回数	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日
	トマトーン	50倍(水1ℓに製品1本を入れる)	開花当日	1花房あたり1回	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
土壌消毒剤	ガスタード微粒剤(劇)	30kg/10a	播種または定植21日前まで	1回	□ /				

・使用時期の「収穫前日まで」とは、薬剤散布を終了した時刻より24時間を経過するまで収穫できないことを示します。

適正管理について！

- 病害虫の発生状況・予察に留意しながら予防・発生初期防除を心がける。
- 圃地の適正な排水管理を行う。
- ドリフト軽減ノズルや防薬ネット等を出来る限り使用する。
- みつばちへの配慮を行う。

防除器具の農薬残留に留意！！

- ・防除器具は、前回散布後に充分洗浄したか確認し、散布当日も薬剤調整前にもう一度通水し洗浄しましょう。
- ・防除器具は使用後、通水で3回以上洗浄しましょう。
- ・洗浄水は川や下水等に流さないようにしましょう。