

【産直用】 ネットメロン防除記録日誌 【2026年度版】

支所名

生産者氏名

組合員コード

品種名

アンデス ・ クインシー
他()

作付面積

a

ほ場No

播種日

月

日

定植日

月

日

収穫始め

月

日

収穫終わり

月

日

確認

害 虫	RAC コード	薬剤名	希釈倍率または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用回数	使用方法	使用した薬剤名の欄の口に✓チェックを入れ、使用月日を記入して下さい。						
コガネムシ類幼虫 ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ	8A	DC油剤(劇)	20 [㏒] /10a (1穴あたり1.5～2ml)	作付け10～15日前まで	1回	全面処理又は作条処理	□ /						
一年生雑草・つる割病・センチュウ類	8A,8F	ディ・トラベックス油剤(劇)	30 [㏒] /10a	は種又は植付の30日前まで		※防除暦参照							
アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類	28	ベリマークSC	薬量 400株当り25ml	希釈水量 400株当り10～20ℓ	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	□ /					
アブラムシ類	4A	モスピラン顆粒水溶剤(劇)		8000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /			
アブラムシ類	9B	チェス顆粒水和剤		5000倍	収穫3日前まで	4回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /		
アブラムシ類・コナジラミ類	29	ウララDF		2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /				
アブラムシ類・※コナジラミ類	4C	トランスフォームフロアブル		※2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /			
アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類・ハダニ類	23	モベントフロアブル		2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /			
アザミウマ類・ウリノメイガ・オオタバコガ・コナジラミ類・ ハスモンヨトウ・ハダニ類・ハモグリバエ類	30	グレーシア乳剤		2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /				
ハダニ類	21A	ダニトンフロアブル		1000倍	収穫前日まで	1回	散布	□ /					
	20B	カネマイトフロアブル		1000倍	収穫前日まで	1回	散布	□ /					
	6	コロマイト乳剤		1000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /				
	10B	バロックフロアブル		2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /				
								□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	
								□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	
病 害	RAC コード	薬剤名	希釈倍率または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用回数	使用方法	使用した薬剤名の欄の口に✓チェックを入れ、使用月日を記入して下さい。						
斑点細菌病・果実汚染細菌病・炭素病・べと病	M01	キノンドー水和剤40	600倍	収穫10日前まで	5回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
斑点細菌病・つる枯病・べと病・炭疽病・疫病	M03	ジマンダイセン水和剤 ※1	400倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	※ ₁ □ /	※ ₁ □ /	※ ₁ □ /	※ ₁ □ /	※ ₁ □ /		
べと病	40,M03	カンパネラ水和剤 ※1,3	1000倍	収穫7日前まで	5回以内	散布	※ _{1,3} □ /	※ _{1,3} □ /	※ _{1,3} □ /	※ _{1,3} □ /	※ _{1,3} □ /		
つる枯病・べと病	40,M05	プロポーズ顆粒水和剤 ※2,3	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	※ _{2,3} □ /	※ _{2,3} □ /	※ _{2,3} □ /	※ _{2,3} □ /	※ _{2,3} □ /		
つる枯病・うどんこ病・べと病	4,M05	フオリオゴールド ※2	800倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	※ ₂ □ /	※ ₂ □ /	※ ₂ □ /				
つる枯病・菌核病	2	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日まで	4回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /			
つる枯病・うどんこ病	M07	ベルケート水和剤	1000倍	収穫前日まで	5回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
つる枯病・菌核病・陥没病	1	トップジンM水和剤	1500倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
つる枯病・うどんこ病	7	アフエットフロアブル	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /					
つる枯病・うどんこ病・陥没病	3	トリフミン水和剤	3000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	□ /	□ /					
べと病	21	ランマンフロアブル	1000倍	収穫前日まで	4回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /			
斑点細菌病・うどんこ病・果実汚斑細菌病	24,M01	カスミンボルドー	1000倍	収穫3日前まで	5回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
つる枯病・うどんこ病・べと病	11	ストロビーフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
斑点細菌病・軟腐病・褐斑細菌病	M01	コサイド3000	2000倍	－	－	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
							□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
							□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		

※1 マンゼブを含む薬剤の総使用回数5回以内 ※2 TPNを含む薬剤の総使用回数5回以内 ※3 ベンチアパリカルブイソプロピルを含む薬剤の総使用回数5回以内