

R8 プチヴェール防除記録日誌【産直用】

支所名		生産者氏名	
-----	--	-------	--

定植日	月	日	収穫始め	月	日
-----	---	---	------	---	---

生産者→最寄のJA →本所園特：事務局行き			
-----------------------	--	--	--

作物名	プチヴェール	作付面積	a
-----	--------	------	---

JA確認		
------	--	--

害虫						薬剤名	希釈倍率または処理量	収穫前使用日数 (使用時期)	使用回数	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを 入れ使用月日を記入して下さい。					
コナガ	アオムシ	アブラムシ類	シロイチモジ ヨトウ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ										
		○				オンコル粒剤5	1g/株	定植時	1回	□ /					
○	○			○	○	アフーム乳剤	1000～2000倍	収穫7日前まで	3回以内	□ /	□ /	□ /			
○	○			○		スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	収穫14日前まで	2回以内	□ /	□ /				
		○				モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	□ /	□ /				
				○		トアロー水和剤CT	500～1000倍	発生初期、 但し収穫前日まで	－	□ /	□ /	□ /	□ /		
○	○						1000～2000倍		－	□ /	□ /	□ /	□ /		
			○		○	ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	発生初期、 但し収穫前日まで	－	□ /	□ /	□ /	□ /		
○	○			○			1000～2000倍		－	□ /	□ /	□ /	□ /		
		○				オレート液剤	100倍	発生初期～収穫前日まで	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
○						フェニックス顆粒水和剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	□ /	□ /				

病害						薬剤名	希釈倍率または処理量	収穫前使用日数 (使用時期)	使用回数	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ使用月日を記入して下さい。					
斑点細菌病	黒腐病	白さび病	病灰色カビ	軟腐病	うどんこ										
				○		バイオキパー水和剤	500～2000倍	発病前～発病初期	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
		○		○	○	ジーファイン水和剤	1000倍	収穫前日まで	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
			○		○	カリグリーン	800倍	収穫前日まで	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
○	○			○		コサイド3000	2000倍	－	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
			○		○	ボトキラー水和剤	1000倍	発病前～発病初期	－	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /
		○				アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	□ /	□ /				
										□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /