

【産直用】ミニトマト防除記録日誌

生産者→最寄のJA→園特 事務局行き

支所名		生産者氏名		生産者コード		作付面積	坪	令和8年度（2026）JA庄内たがわ
-----	--	-------	--	--------	--	------	---	--------------------

定植日	月	日	収穫始め	月	日	収穫終了	月	日	確認		
-----	---	---	------	---	---	------	---	---	----	--	--

殺虫剤									薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前使用 日数 （使用時期）	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。							
ハスモンヨトウ	トマトサビダニ	オオタバコガ	ナミハダニ	トマトキバガ	アザミウマ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	アブラムシ類					□	／						
						○	○	○	ベストガード粒剤	2g /植穴	定植時	1回	□	／						
						○		○	アドマイヤー1 粒剤(劇)	1～2g /植穴	定植時	1回	□	／						
					○	○	○	○	ベリマークSC	400株当たり25ml	育苗期後半～定植当日	1回	□	／						
					○	○		○	ベストガード水溶剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	□	／	□	／	□	／		
○	○	○			○ ミカン	○	○		カスケード乳剤	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	□	／	□	／				
	○	○	○	○	○ ミカン				コテツフロアブル(劇)	2000倍	収穫前日まで	3回以内	□	／	□	／	□	／		
					○	○		○	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	2000倍	収穫前日まで	3回以内	□	／	□	／	□	／		
	○					○	○		コロマイト乳剤	1500倍	収穫前日まで	1回	□	／	□	／				
	○	○		○		○	○		アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	5回以内	□	／	□	／	□	／	□	／
○		○		○					フェニックス顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	□	／	□	／				
						○			ラノーテープ	10～50㎡/10a	栽培期間中	1回	□	／						
													□	／	□	／	□	／	□	／

殺菌剤									薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前使用 日数 (使用時期)	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。											
		輪 紋 病	すす か び 病	菌 核 病	うどんこ 病	斑点 病	灰色か び病	葉か び病																
			○		○	○	○	○	ベルコートフロアブル	4000倍	収穫前日まで	2回以内	□	/	□	/								
			○		○			○	トリフミン水和剤	3000倍	収穫前日まで	5回以内	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/		
					○		○		ボトキラー水和剤	1000倍	発病前～発病初期	-	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
					○		○	○	カリグリーン	800倍	収穫前日まで	-	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
					○		○		ハーモメイト水溶剤	800倍	収穫前日まで	-	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/
		○	○	○	○		○	○	シグナムWDG	2000倍	収穫前日まで	2回以内	□	/	□	/								
													□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/

植物成長 調節剤	薬剤名		希釈倍率または処理量	収穫前使用日数（使用時期）	使用回数	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日	使用月日
	トマトトーン		低温時（20℃）以下50倍 高温時（20℃）以上100倍	開花前3日～開花後3日位	1花房につき1回	□	／	□	／	□	／	□	／	□	／

※病害虫予防は防虫ネット設置や通風、換気にも配慮し、薬剤以外の対応も忘れずに行うこと。