

【産直用】赤かぶ防除記録日誌

園特 赤かぶ事務局行き

令和8年度(2026年)

支所名		組合員 コード		氏名		作物名	赤かぶ	面積	a
-----	--	------------	--	----	--	-----	-----	----	---

播種日	月	日	収穫始め	月	日	収穫終わり	月	日	確認		
-----	---	---	------	---	---	-------	---	---	----	--	--

殺虫剤	コナガ	アオムシ	アブラムシ類	ナモグリバエ	メイマダラノ	シキシノミハム	薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。			
						○	フォース粒剤(劇)	4kg/10a	播種時	1回以内	□	／		
			○			○	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1回以内	□	／		
	○	○	○		○	○	エルサン乳剤(劇)	1000倍	収穫30日前迄	2回以内	□	／	□	／
	○		○	○	○	○	ハチハチ乳剤(劇)	2000倍	収穫7日前迄	1回	□	／		
	○						アニキ乳剤	1000倍	収穫前日まで	合わせて 3回以内	□	／	□	／
						○	アニキ乳剤	2000倍			□	／	□	／
			○				マラソン乳剤	2000倍	収穫14日前迄	4回以内	□	／	□	／

殺菌剤	白さび病	べと病	斑点細菌病	黒腐病	軟腐病	根こぶ病	薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。			
						○	ネビジン粉剤	30kg/10a	播種前	1回以内	□	／		
						○	オラクル粉剤	30kg/10a	播種前	1回以内	□	／		
	○	○					ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日まで	3回以内	□	／	□	／
			○	○	○		コサイド3000 (バイカルティ1000倍加用)	2000倍	-	-	□	／	□	／

除草剤					一年生イネ科雑草	畑地一年生雑草	薬剤名	希釈倍率 または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用 回数	使用した薬剤名の欄の□に✓チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。			
						○	トレファノサイド乳剤	#REF!	播種直後	1回以内	□	／		
					○		ナブ乳剤	#REF!	雑草生育期 (7日前まで)	1回以内	□	／		

防除暦◆出荷開始までに提出必要書類