

【産直用】里芋防除記録日誌

令和8年(2026年)版

支所名		生産者氏名		作物名	さといも	品種名		作付面積	a	ほ場数	ヶ所
-----	--	-------	--	-----	------	-----	--	------	---	-----	----

定植日	月	日	収穫始め	月	日	収穫終わり	月	日	確認		
-----	---	---	------	---	---	-------	---	---	----	--	--

害 虫										登録農薬名	希釈倍数	使用時期	使用回数	RACコード	薬剤名の欄の□に✓(チェック)を入れ使用月日を記入して下さい。		
				黒斑病	ハカダンニザワ	ハダニ類	シコ類幼ネム	ヨトウモン	シアブラム								
				○						ベンレートT水和剤20	-	植付前	1回	F:M03 F:1	□ /		
							○			ダイアジノンSLゾル	25~50倍	植付前	1回	I:1B	□ /		
									○	アドマイヤー1粒剤	-	植付時	1回	I:4A	□ /		
							○			オンコル粒剤5	-	生育期(但し、収穫60日前まで)	1回	I:1A	□ /		
								○		トレボン乳剤	1000倍	収穫14日前まで	3回以内	I:3A	□ /	□ /	□ /
									○	ウララDF	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	I:29	□ /	□ /	
					○			○		コテツフロアブル(劇)	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	I:13	□ /	□ /	
						○				コロマイト乳剤	1000倍	収穫前日まで	2回以内	I:6	□ /	□ /	
								○		フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	収穫前日まで	2回以内	I:28	□ /	□ /	

除草剤	薬剤名	希釈倍率または処理量	収穫前使用日数(使用時期)	使用回数	RACコード	使用月日			散布量
	ゴーゴーサン細粒剤F	-	植付後萌芽前(雑草発生前)	1回以内	H:3	□ /			ml
	クレマート乳剤	-	植付後萌芽前(雑草発生前)	1回以内	H:3	□ /			ml
	バスタ液剤	-	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・植付前又は畦間処理)	3回以内	H:10	□ /	□ /	□ /	ml