

作物名	軟白ねぎ	品種名		支所名		氏名		組合員コード																									
作付面積		坪		圃場数		ヶ所		育苗	CP-303 セルトレイ	LP-303 穴	播種 粒数		粒/穴		育苗枚数		枚		播種日		月		日	定植日		月		日	収穫始め		月		日

害 虫									系統	RACコード	薬剤名 ※同系統の薬剤の 連用・多用は避ける	希釈倍率 または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用回数	使用方法	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。								
クロバネキノコバエ類	ネダニ類	ネギコガ	シロイチモジヨトウ	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネキリムシ類	※農薬ごとの作用性を分類したものを「RACコード」といい、製品ラベルなどに表示されています。RACコードが同じものには、系統の欄に同じ文字を記載しています。															
			○	○		○		○	M	28	ベリマークSC	400倍	(セル成型育苗トレイ1箱又は ペーパーポット1冊当り) 0.5リットル	育苗期後半 ～定植当日	1回	かん注	□ /	} ※いずれかを選択						
	○				○		○	○	A	4A 28	ジュリボフロアブル	200倍	(セル成型育苗トレイ1箱又は ペーパーポット1冊当り) 0.5リットル	育苗期後半 ～定植当日	1回	かん注	□ /							
○					○		○		A	4A	ベストガード粒剤	6kg/10a	定植時	1回	植溝処理土壌混和	□ /								
○	○								H	1B	トクチオン細粒剤F	9kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	□ /								
○	○							○ 定植時		3A	フォース粒剤(劇)	9kg/10a	定植時	1回	作条土壌混和	□ /								
○	○											収穫30日前	1回	株元散布	□ /									
								○	H	1B	ネキリエースK	3kg/10a	30日前	2回以内	土壌表面株元処理	□ /	□ /							
	○				○		○		A	4A	ダントツ粒剤	6kg/10a	3日前	4回以内	株元散布	□ /	□ /	□ /						
		○	○	○		○			M	28	ブリロッソ粒剤オメガ	6kg/10a	前日	3回以内	株元散布	□ /	□ /	□ /						
	○									16	アプロードフロアブル	500倍	14日前	1回	株元かん注	□ /								
○		○	○	○		○			B	30	グレーシア乳剤	2000倍	7日前	2回以内	散布	□ /	□ /							
		○	○		○	○			H	1B	トクチオン乳剤	1000倍	7日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
	○							2000倍				株元かん注			□ /	□ /	□ /							
		○			○		○			14	リーフガード顆粒水和剤(劇)	1500倍	7日前	2回以内	散布	□ /	□ /							
○		○	○		○	○				21A	ハチハチ乳剤(劇)	1000倍	7日前	2回以内	散布	□ /	□ /							
		○	○		○					13	コテツフロアブル(劇)	2000倍	7日前	2回以内	散布	□ /	□ /							
○		○	○	○		○			M	28	ヨーバルフロアブル	2500倍	3日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
					○	○				6	アグリメック(劇)	1000倍	3日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
					○		○		A	4A	アクタラ顆粒水溶剤	1000倍	3日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
					○		○			9B	コルト顆粒水和剤※	2000倍	3日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
		○	○	○					M	28	プレバソンフロアブル5	2000倍	3日前	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
		○	○		○	○				5	ディアナSC	2500倍	前日	2回以内	散布	□ /	□ /							
		○	○		○				B	30	プロフレアSC	2000倍	前日	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /						
																□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
																□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		

※コルト顆粒水和剤は予防として使用する。食害が見られる場合は他剤を使用する。

病 害									系統	RAC コード	効果等	薬剤名 ※同系統の薬剤の連 用・多用は避ける	希釈倍率 または 処理量	収穫前 使用日数 (使用時期)	使用回数	使用用法	使用した薬剤名の欄の□に✔チェックを入れ 使用月日を記入して下さい。							
黒腐菌核病	白絹病	小菌核腐敗病	べと病	黒斑病	葉枯病	さび病	軟腐病	萎ちよう病	※農薬ごとの作用性を分類したものを「RACコード」といい、製品ラベルなどに表示されています。RACコードが同じものには、系統の欄に同じ文字を記載しています。															
								○	イ	3	トリフミン水和剤		①50倍 ②100倍 ③200倍	(5～30分間苗根部浸漬) (セル成型育苗トレイ1箱 又はペーパーポット1冊当り 0.5リットル) (セル成型育苗トレイ1箱 又はペーパーポット1冊当り 1リットル)	定植直前 定植前	1回	5～30分間苗根部浸漬 苗床かん注	□ □ / □						
			○							21	予防・治療	ランマンフロアブル	2000倍	3日前		4回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /			
							○			P02	予防	オリゼメート粒剤	6kg/10a	30日前	☆	2回以内	株元散布・土寄せ時	□ /	□ /					
							○			24/M01	予防・治療	カスミンボルドー	1000倍	14日前		2回以内	散布	□ /	□ /					
							○			31	予防・治療	スターナ水和剤	2000倍	7日前		3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
							○										散布	□	□ /	□	/			
	○									U18	予防・治療	バリダシン液剤5	500倍	前日	☆	2回以内	株元散布	□ /				□ /		
			○				○		ホ	M01	予防	Zボルドー	500倍	発病前～発病初期	☆	—	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
							○		ホ	M01	予防	コサイド3000	2000倍	—		—	散布	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
				○	○		○		ヘ	M03	予防	ジマンダイセン水和剤	600倍	14日前	☆	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
			○	○	○	○			イ・ヘ	3/M03	予防・治療	テーク水和剤	600倍	14日前			□	□ /	□	□ /				
			○	○	○	○				M05	予防	ダコニール1000	1000倍	14日前	☆	3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
				○	○	○			ハ	11	予防・治療	アミスター20フロアブル	2000倍	3日前		4回以内	散布	□ /	□ /	□ /	□ /			
○	○	○	○	○	○	○			ハ	11	予防・治療	メジャーフロアブル	2000倍	前日		3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
(○) かん注	(○) かん注			○		○			ニ	7	予防・治療	カナメフロアブル(劇)	4000倍	前日		3回以内	散布/(株元かん注)	□ /	□ /	□ /				
○	○	○		○	○	○			ニ	7	予防・治療	パレード20フロアブル	2000倍	前日		3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
○	○								ニ	7	予防・治療	アフエットフロアブル	2000倍	14日前	2回以内	株元かん注 1ℓ/m ²	□	/	□	/				
	○	○		○	○	○								散布		□								
		○		○						2	予防・治療	ロブラール水和剤	1000倍 500倍	14日前		3回以内	散布	□	/	□	/	□	/	
	○	○								1	予防・治療	トップジンM水和剤	1000倍	7日前		3回以内	散布							
○	○	○								12	予防	セイビアーフロアブル20	1000倍	前日		3回以内	散布	□ /	□ /	□ /				
																	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		
																	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /	□ /		

☆：耐性がでにくい薬剤

展着剤	薬剤名	散布液10ℓ当り使用量	使用方法	JA確認欄					
	アプローチBI	5ml	添加						
	ミックスパワー	3.3ml							
	ワイドコート	1～3.3ml							