

【産直用】2026年産（令和8年） 日 本 な し 栽 培 管 理 日 誌

栽培・防除指針を遵守して2026年産（令和8年）日本なしを生産し、その内容を全て下記に記入し報告致します。

※コンテナカードを配布する際に必ず持参願います。

この日本なし栽培管理日誌と引き換えにコンテナカードを配布致します。

J A 庄 内 た が わ

園芸特産課

TEL 0235-64-5831

生産工程管理記帳運動

支 所 名	南部支所		組合員コード	
住 所	山形県鶴岡市			
氏 名				
電話番号	0235 — 57 —			
作付面積	a		収穫始め	月 日
ほ 場 数	ヶ所		収穫終わり予定日	月 日

JA確認印	備考
㊞	
㊞	

【病 害 虫 防 除 計 画】										防 除 記 入 欄		
回数	散布時期	対象病害虫	使用薬剤	希釈倍率	収穫前日数	使用回数 (以内)	10a当たり 散布薬量	使用した薬剤に 印を付ける	散布月 日	※防除計画と相違がある場合のみ、 使用薬剤名・希釈倍率を記入すること		
R7 18	10月上旬 (収穫後)	黒星病・黒斑病	ハイテンパワー オキシラン水和剤	5,000倍 600倍	21日前まで	9	300ℓ	☐	/			
R7 特別	10月中旬 ～下旬	枝枯細菌病・黒星病・黒斑病・輪紋病	ドキリンフロアブル	1,000倍	21日前まで	9	300ℓ	☐	/			
特別	発芽前(3月)	越冬病害虫	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	—	200ℓ	☐	/			
1	発芽前	カイガラムシ類・ハダニ類	スプレーオイル ハーベストオイル	50倍 50倍	発芽前 発芽前	—	200ℓ	☐	/			
2	発芽前	黒星病・赤星病・輪紋病	オーソサイド水和剤80	600倍	3日前まで	9	200ℓ	☐	/			
3	発芽7日後	黒星病・黒斑病 ハマキムシ類・クワコナカイガラムシ シンクイムシ類	オキシラン水和剤 スミチオン水和剤40	600倍 800倍	21日前まで 21日前まで (無袋栽培)	9 6	200ℓ	☐	/			
4	開花直前	黒星病・輪紋病・黒星病・赤星病 黒星病・黒斑病・輪紋病・うどんこ病	ハイテンパワー スコア顆粒水和剤 ベルコート水和剤	5,000倍 2,000倍 1,500倍	14日前まで 14日前まで	3 5	250ℓ	☐	/			
5	交配直前	黒星病・心腐れ症(胴枯病菌)	トップジンM水和剤	1,500倍	前日まで	6	250ℓ	☐	/			
6	落花直後	赤星病・うどんこ病・黒星病・輪紋病 黒斑病・炭疽病・褐色斑点病・赤星病 心腐れ症(胴枯病菌)・黒星病 ハマキムシ類・ハダニ類・シンクイムシ類 ナシチビガ・アブラムシ類・カメムシ類	アンビルフロアブル チオノックフロアブル テルスター水和剤	1,000倍 500倍 1,000倍	7日前まで 30日前まで 前日まで	3 5 2	250ℓ	☐	/			
7	落花7日後	赤星病・黒星病・黒斑病 黒斑病・炭疽病・褐色斑点病・赤星病 心腐れ症(胴枯病菌)・黒星病	カナメフロアブル チオノックフロアブル	4,000倍 500倍	前日まで 30日前	3 5	250ℓ	☐	/			
8	落花14日後	赤星病・疫病・褐色斑点病・黒星病 黒斑細菌病・黒斑病・炭疽病 心腐れ症(胴枯病菌)・輪紋病 アブラムシ類・カメムシ類 シンクイムシ類・ハマキムシ類	デランフロアブル アグロスリン水和剤	1,000倍 1,000倍	60日前まで 前日まで	4 3	300ℓ	☐	/			
9	5月下旬	黒斑病・炭疽病・褐色斑点病・赤星病 心腐れ症(胴枯病菌)・黒星病 アブラムシ類・チャノキアザミウマ	チオノックフロアブル ウララDF	500倍 2,000倍	30日前まで 14日前まで	5 2	300ℓ	☐	/			
10	6月上旬	黒斑病・黒星病・輪紋病・炭疽病 心腐れ症(胴枯病菌)・褐色斑点病 ケムシ類・シンクイムシ類 アブラムシ類・カメムシ類	ハイテンパワー ファンタジスタ顆粒水和剤 スタークル顆粒水溶剤	5,000倍 3,000倍 2,000倍	前日まで 前日まで	3 3	300ℓ	☐	/			
11	6月中旬	黒星病・輪紋病・赤星病 ケムシ類・シンクイムシ類 ハマキムシ類・ヒメボクトウ ハダニ類	オーソサイド水和剤80 サムコルフロアブル10 スターマイトフロアブル	600倍 5,000倍 2,000倍	3日前まで 前日まで 前日まで	9 3 1	300ℓ	☐	/			
12	6月下旬 (袋かけ後)	黒星病・黒斑病・輪紋病 炭疽病・うどんこ病 シンクイムシ類・カメムシ類 コナカイガラムシ類・(アブラムシ類)	ハイテンパワー ナリアWDG アクタラ顆粒水溶剤	5,000倍 2,000倍 2,000倍	前日まで 前日まで	3 3	300ℓ	☐	/			
13	7月上旬	黒星病・黒斑病・輪紋病・うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類 シンクイムシ類	ベルコート水和剤 ロディー水和剤	1,500倍 1,000倍	14日前まで 前日まで	5 2	300ℓ	☐	/			
14	7月中旬	黒斑病・輪紋病・黒星病・赤星病 ハダニ類	スコア顆粒水和剤 マイトコーネフロアブル	2,000倍 1,000倍	14日前まで 前日まで	3 1	300ℓ	☐	/			
15	7月下旬	黒星病・黒斑病・輪紋病・うどんこ病 シンクイムシ類・アブラムシ類 カメムシ類・ケムシ類	ハイテンパワー ベルコート水和剤 ダントツ水溶剤	5,000倍 1,500倍 2,000倍	14日前まで 前日まで	5 3	300ℓ	☐	/			
16	8月初旬	ハダニ類 アザミウマ類・シンクイムシ類 ハマキムシ類	ハイテンパワー コロマイト水和剤 ディアナWDG	5,000倍 2,000倍 10,000倍	前日まで 前日まで	1 2	400ℓ	☐	/			
特別	8月初旬 ～中旬	うどんこ病・黒星病・(胴枯病) 心腐れ症(胴枯病菌)・輪紋病	スクレアフロアブル	2,000倍	前日まで	3	300ℓ	☐	/			
17	8月中旬 (時期厳守)	ハマキムシ類・ハダニ類・シンクイムシ類 ナシチビガ・アブラムシ類・カメムシ類	ハイテンパワー テルスター水和剤	5,000倍 1,000倍	前日まで	2	300ℓ	☐	/			
特別	8月中旬 ～9月上旬	ハダニ類・ニセナシサビダニ	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日まで	1	300ℓ	☐	/			
特別	9月上旬	シンクイムシ類・アブラムシ類 カメムシ類・ケムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	前日まで	3	300ℓ	☐	/			

土づくり・施肥記入欄(昨年秋の礼肥から記入する)					上記以外の農薬使用について記入する				
施肥月 日	肥料名	10a当たり施用量	全面積の 施用量	散布月 日	使用薬剤名	希釈倍率	10a当たり 散布量		
/		kg	kg	/		倍			
/		kg	kg	/		倍			
/		kg	kg	/		倍			
/		kg	kg	/		倍			
散布月 日	葉面散布肥料名	濃度	10a当たり 散布量	/		倍			
/		倍		/		倍			
/		倍		/		倍			

※防除内容や施肥内容が品種で違う場合には、その箇所に「幸水のみ防除」・「豊水のみ防除」等を記入頂き判別できるようにお願い致します。