

【産直用】2026年産（令和8年） 西 洋 な し 栽 培 管 理 日 誌

J A 庄 内 た が わ
園 芸 特 産 課
TEL 0235-64-5831

栽培・防除指針を遵守して2026年産（令和8年）西洋なしを生産し、その内容を全て下記に記入し報告致します。

生産工程管理記帳運動

支 所 名	南部支所	組合員コード	
住 所	山形県鶴岡市		
氏 名			
電話番号	0235 — 57 —		
作付面積	a	収穫始め	月 日
ほ 場 数	ヶ所	収穫終わり予定日	月 日

JA確認印	備考
㊞	
㊞	

【病 害 虫 防 除 計 画】								防 除 記 入 欄		
回数	散布時期	対象病害虫	使用薬剤	希釈 倍率	収穫前日数	使用回数 (以内)	10a当たり 散布薬量	使用した薬剤に ☑	散布月 日	※防除計画と相違がある場合のみ、使用薬剤名・希釈倍率を記入すること
特別	11月下旬～ 12月上旬	胴枯病・輪紋病	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	－	300 ℓ	☐	/	
1	発芽前	ハダニ類・カイガラムシ類	スプレーオイル	又は 50倍	発芽前	－	300 ℓ	☐	/	
			ハーベストオイル	50倍	発芽前	－		☐		
		胴枯病・輪紋病	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	－	300 ℓ	☐	/	
								☐		
2	落花直後	黒星病・輪紋病・赤星病	オーソサイド水和剤80	600倍	3日前まで	9	300 ℓ	☐	/	
3	5月中旬	黒星病・輪紋病・胴枯病	トップジンM水和剤	1,500倍	前日まで	6	350 ℓ	☐	/	
		シンクイムシ類・ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40	1,000倍	21日前まで 14日前まで	(無袋) 6 (有袋)		☐		
4	5月下旬	黒星病・輪紋病	オキシンドー水和剤80	1,400倍	21日前まで	9	350 ℓ	☐	/	
5	6月上旬	黒星病・輪紋病・赤星病	オーソサイド水和剤80	600倍	3日前まで	9	400 ℓ	☐	/	
		アブラムシ類・シンクイムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 (調)	2,000倍	前日まで	3		☐		
			バイカルティ	1,000倍				☐		
6	6月中旬	輪紋病・(炭疽病)	オキシラン水和剤	600倍	21日前まで	9	500 ℓ	☐	/	
		シンクイムシ類・ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ類	スミチオン水和剤40	1,000倍	21日前まで 14日前まで	(無袋) 6 (有袋)		☐		
			バイカルティ	1,000倍				☐		
7	6月下旬	黒星病、輪紋病、赤星病	オーソサイド水和剤80	600倍	3日前まで	9	500 ℓ	☐	/	
		アブラムシ類・シンクイムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 (調)	1,000倍	前日まで	3		☐		
8	7月上旬	輪紋病	ICボルドー412	30倍	－	－	500 ℓ	☐	/	
		シンクイムシ類・ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40	1,000倍	21日前まで 14日前まで	(無袋) 6 (有袋)		☐		
9	7月中旬	輪紋病・炭疽病	ストロビードライフロアブル	2,000倍	前日まで	3	500 ℓ	☐	/	
		シンクイムシ類	アグロスリン水和剤 (調)	1,000倍	前日まで	3		☐		
10	7月下旬		ハイテンパワー	5,000倍			500 ℓ	☐	/	
		輪紋病	オキシンドー水和剤80	1,400倍	21日前まで	9		☐		
		シンクイムシ類・ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40	1,000倍	21日前まで 14日前まで	(無袋) 6 (有袋)		☐		
		ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日まで	1		☐		
			バイカルティ	1,000倍				☐		
11	8月上旬	輪紋病・(炭疽病)	オキシラン水和剤	600倍	21日前まで	9	500 ℓ	☐	/	
		ケムシ類・シンクイムシ類 ハマキムシ類・ヒメボクトウ	サムコルフロアブル10	5,000倍	前日まで	3		☐		
12	8月中旬		ハイテンパワー	5,000倍			500 ℓ	☐	/	
		輪紋病	オキシンドー水和剤80	1,400倍	21日前まで	9		☐		
		シンクイムシ類・アブラムシ類 カメムシ類・ケムシ類 コナカイガラムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	前日まで	3		☐		
13	8月下旬		ハイテンパワー	5,000倍			500 ℓ	☐	/	
		輪紋病・(炭疽病)	オキシラン水和剤	600倍	21日前まで	9		☐		
		シンクイムシ類・カメムシ類 アブラムシ類・ハマキムシ類	アグロスリン水和剤 (調)	1,000倍	前日まで	3		☐		
14	9月上旬		ハイテンパワー	5,000倍			500 ℓ	☐	/	
		輪紋病	オキシンドー水和剤80	1,200倍	21日前まで	9		☐		
		シンクイムシ類・アブラムシ類 カメムシ類・ケムシ類 コナカイガラムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	前日まで	3		☐		
15	9月中下旬		ハイテンパワー	5,000倍			500 ℓ	☐	/	
		胴枯病	トップジンM水和剤	1,500倍	前日まで	6		☐		
土づくり・施肥記入欄(昨年秋の礼肥から記入する)					上記以外の農業使用について記入する					
施肥月 日	肥料名		10a当たり施用量	全面積の施用量	散布月 日	使用薬剤名		希釈倍率	10a当たり 散布薬量	
/			kg	kg	/			倍	ℓ	
/			kg	kg	/			倍	ℓ	
/			kg	kg	/			倍	ℓ	
/			kg	kg	/			倍	ℓ	
散布月 日	葉面散布肥料名		濃度	10a当たり散布量	/			倍	ℓ	
/			倍	ℓ	/			倍	ℓ	
/			倍	ℓ	/			倍	ℓ	

※防除内容や施肥内容が品種で違う場合には、その箇所に「ラフランスのみ防除」等を記入頂き、判別できるようにお願い致します。