

【産直用】令和8年度 醸造用ぶどう（水稲育苗ハウス等施設栽培用） 防除日誌

防除指針を遵守して今年産ワイン用ぶどうを生産し、その内容を全て下記に記入して報告します。

JA庄内たがわ
園芸特産課
TEL 0235-64-5831

支 所 名		
住 所	山形県	
組合員コード		
氏 名		
電話番号	023 — —	
作付面積	a	収穫始め 月 日
ほ 場 数	ヶ所	収穫終わり予定日 月 日

生産工程防除記帳運動

品 種 名	JA確認印	備考
	Ⓔ	
	Ⓔ	

【病 害 虫 防 除 計 画】								防 除 記 入 欄		
回数	散布時期	対象病虫害	使用薬剤	希釈倍率	収穫前日数	使用回数(以内)	10a当たり散布薬量	使用した薬剤に☑	散布月 日	※防除計画と相違がある場合のみ、使用薬剤名・希釈倍率を記入すること
R7 特別	収穫後 (10月)	晩腐病、褐斑病 灰色かび病、べと病	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前まで	3	300 ℓ	☐	/	
		アブラムシ類	スミチオン乳剤	1,000倍	90日前まで	2		☐		
R7 特別	休眠期	ブドウトラカミキリ	トラサイドA乳剤	300倍	発芽前 (休眠期)	2	250 ℓ	☐	/	
特別 ①	萌芽前 (4月上中旬)	黒とう病 晩腐病	ベンレート水和剤	500倍	休眠期	1	250 ℓ	☐	/	
		越冬病虫害 (サビダニ類)	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	—		☐		
特別 ②	展葉期 (5月上旬)	フタテンヒメココバイ ブドウスカシバ	スミチオン乳剤	1,000倍	90日前まで	2	250 ℓ	☐	/	
1	展葉5枚～7枚 (5月中下旬)	べと病、黒とう病、 晩腐病、灰色かび病	テーク水和剤	1,000倍	45日前まで	2	300 ℓ	☐	/	
		アザミウマ類 フタテンヒメココバイ コガネムシ類成虫	モスピラン顆粒水溶剤 劇	2,000倍	14日前まで	3		☐		
2	開花直前 (6月上旬)	灰色かび病、うどんこ病 晩腐病、褐斑病	フルーツセイバー	1,500倍	7日前まで	3	300 ℓ	☐	/	
3	落花直後 ～幼果期 (6月中旬)	黒とう病 灰色かび病 うどんこ病	インダーフロアブル	8,000倍	30日前まで	3	300 ℓ	☐	/	
		フタテンヒメココバイ チャノキイロアザミウマ コガネムシ類	アグロスリン水和剤 劇	2,000倍	21日前まで	5		☐		
特別 ③	7月上旬	うどんこ病、さび病 褐斑病、黒とう病 灰色かび病	カナメフロアブル	4,000倍	前日まで	3	300 ℓ	☐	/	
4	7月下旬	べと病、晩腐病 黒とう病、褐斑病	ホライズンドライフロアブル	2,500倍	21日前まで	3	300 ℓ	☐	/	
		チャノキイロアザミウマ コガネムシ類 カメムシ類	テッパン液剤	2,000倍	前日まで	2		☐		
5	8月下旬	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病	オーシャインフロアブル	2,000倍	7日前まで	2	300 ℓ	☐	/	
		チャノキイロアザミウマ コガネムシ類 カメムシ類	ダントツ水溶剤	2,000倍	前日まで	3		☐		
特別 ④	9月中下旬	うどんこ病、さび病 褐斑病、黒とう病 灰色かび病	カナメフロアブル	4,000倍	前日まで	3	300 ℓ	☐	/	