

【産直用】令和8年度 醸造用ぶどう 防 除 日 誌

JA庄内たがわ
園芸特産課
TEL 0235-64-5831

防除指針を遵守して今年産醸造用ぶどうを生産し、その内容を全て下記に記入し報告致します。

支 所 名		
住 所	山形県鶴岡市	
組合員コード		
氏 名		
電話番号	023 — —	
作付面積	a	収穫始め 月 日
ほ 場 数	ヶ所	収穫終わり予定日 月 日

生産工程防除記帳運動

品 種 名	確認印	備考
	㊟	
	㊟	

【病 害 虫 防 除 計 画】								防 除 記 入 欄		
回数	散布時期	対象病害虫	使用薬剤	希釈倍率	収穫前日数	使用回数(以内)	10a当たり散布薬量	使用した薬剤に☑	散布月日	※防除計画と相違がある場合のみ、使用薬剤名・希釈倍率を記入すること
R7 特別	収穫後 (10月)	晩腐病、褐斑病 灰色かび病、べと病	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前まで	3	300ℓ	☐	/	
		アブラムシ類、 (クワコナカイガラムシ)	スミチオン乳剤	1,000倍	90日前まで	2		☐		
R7 11	休眠期	ブドウトラカミキリ	トラサイドA乳剤	300倍	休眠期	2	250ℓ	☐	/	
1	萌芽期 (4月中旬)		展着剤(ハイテンパワー)	10,000倍	—	—	250ℓ	☐	/	
		黒とう病、晩腐病	ベンレート水和剤	500倍	休眠期	1		☐		
		越冬病害虫	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	—		☐		
2	展葉期 (5月上旬)		展着剤(ハイテンパワー)	10,000倍	—	—	250ℓ	☐	/	
		べと病、黒とう病、晩腐病	ジマンダイセン水和剤	1,000倍	45日前まで	2		☐		
		フタデンヒメヨコバイ クワコナカイガラムシ	スミチオン水和剤40	1,000倍	90日前まで	2		☐		
3	展葉5枚～7枚 (5月中下旬)	黒とう病、べと病	デランフロアブル 劇	1,000倍	落弁期まで 但し収穫75日前まで	2	300ℓ	☐	/	
		アザミウマ類 フタデンヒメヨコバイ コガネムシ類成虫	モスピラン顆粒水溶剤 劇	2,000倍	14日前まで	3		☐		
4	開花直前 (6月上旬)		展着剤(ハイテンパワー)	10,000倍	—	—	300ℓ	☐	/	
		灰色かび病、晩腐病	スイッチ顆粒水和剤	3,000倍	30日前まで	2		☐		
		べと病、黒とう病、晩腐病	ジマンダイセン水和剤	1,000倍	45日前まで	2		☐		
5	落花直後～ 幼果期 (6月中旬)	晩腐病、褐斑病 灰色かび病、べと病	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前まで	3	300ℓ	☐	/	
		コガネムシ類	アグロスリン水和剤 劇	2,000倍	21日前まで	5		☐		
6	6月下旬	黒とう病、灰色かび病	インダーフロアブル	8,000倍	30日前まで	3	300ℓ	☐	/	
		べと病	レーバスフロアブル	2,000倍	7日前まで	3		☐		
7	肥大期 (7月上旬)		展着剤(ハイテンパワー)	10,000倍	—	—	300ℓ	☐	/	
		晩腐病、褐斑病 灰色かび病、べと病	オーソサイド水和剤80	800倍	30日前まで	3		☐		
		チャノキイロアザミウマ フタデンヒメヨコバイ コガネムシ類	ダントツ水溶剤	4,000倍	前日まで	3		☐		
8	7月下旬	べと病、晩腐病 黒とう病、褐斑病	ホライズンドライフロアブル	2,500倍	21日前まで	3	300ℓ	☐	/	
		フタデンヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ類 コガネムシ類	アグロスリン水和剤 劇	2,000倍	21日前まで	5		☐		
9	着色初期 (8月上旬)	べと病	ランマンフロアブル	2,000倍	14日前まで	3	300ℓ	☐	/	
		チャノキイロアザミウマ フタデンヒメヨコバイ コガネムシ類	ダントツ水溶剤	4,000倍	前日まで	3		☐		
特別	8月中旬	黒とう病、べと病 褐斑病、灰色かび病 晩腐病	ストロビードライフロアブル	3,000倍	14日前まで	3	300ℓ	☐	/	
10	8月下旬	うどんこ病、灰色かび病 黒とう病	オーシャインフロアブル	2,000倍	7日前まで	2	300ℓ	☐	/	
		コガネムシ類	アディオン水和剤	2,000倍	7日前まで	5		☐		
特別	9月上旬	黒とう病、さび病 褐斑病、灰色かび病 晩腐病、うどんこ病	フルーツセイバー	1,500倍	7日前まで	3	300ℓ	☐	/	
特別	9月上旬	べと病	レーバスフロアブル	2,000倍	7日前まで	3	300ℓ	☐	/	
特別	9月中下旬	晩腐病、灰色かび病	オンリーワンフロアブル	2,000倍	前日まで	3	300ℓ	☐	/	